Chromosome 1
−Log Base 10 p−value
0
1
2
3
4
5
6
0
50
100
150
200
250
300
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 2
−Log Base 10 p−value
0
1
2
3
4
0
50
100
150
200
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 3
−Log Base 10 p−value
0
1
2
3
4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 4
−Log Base 10 p−value
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
50
100
150
200
250
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 5
−Log Base 10 p−value
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 6
−Log Base 10 p−value
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 7
−Log Base 10 p−value
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 8
−Log Base 10 p−value
0
2
4
6
8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 9
−Log Base 10 p−value
0
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120
140
Base Pairs (x10^{-6})

Chromosome 10
−Log Base 10 p−value
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Base Pairs (x10^{-6})